Estructuras Algebraicas II

Práctica 2 – Segundo Cuatrimestre de 2017

Extensiones de cuerpos, polinomios minimales, y elementos algebraicos

Nota: Con $m(x, K)$ se notará el polinomio minimal del elemento x sobre el cuerpo K y con ξ_n una raíz n-ésima primitiva de la unidad.

Ejercicio 1. Sea E/K una extensión, y sea $x \in E$ algebraico sobre K. Dada una subextensión F/K de E/K, probar que $m(x, F)$ divide a $m(x, K)$. Dar ejemplos con $m(x, F) = m(x, K)$ y con $m(x, F) \neq m(x, K)$.

Ejercicio 2. Calcular los siguientes polinomios minimales:

i) $m\big(\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}\big)$ ii) $m\left(\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}[\sqrt{2}\,]\right)$ iii) $m\left(\sqrt[4]{2}, \mathbb{Q}[\sqrt[4]{2}\,]\right)$

iv) $m\left(\sqrt[4]{-1}, \mathbb{Q}\,\right)$ v) $m\left(\sqrt[4]{-1}, \mathbb{Q}[i]\,\right)$ vi) $m\,(w, \mathbb{R})$ con $w \in \mathbb{C}$

Ejercicio 3. Calcular:

i) $\big[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, i] : \mathbb{Q}\big]$.

ii) $\big[\mathbb{Q}[\sqrt[3]{3}, \sqrt[5]{7}\,] : \mathbb{Q}\big]$.

iii) $\big[\mathbb{Q}[\sqrt{2}, \sqrt{3}\,] : \mathbb{Q}\big]$.

iv) $\big[\mathbb{Q}[\sqrt{2} + \sqrt{3}\,] : \mathbb{Q}\big]$ y $m(\sqrt{2} + \sqrt{3}, \mathbb{Q})$.

iv) $\Big[\mathbb{Q}\big[\sqrt{2 - \sqrt{3}}\,\big] : \mathbb{Q}\Big]$.

v) $\left[\mathbb{Q}[\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}] : \mathbb{Q}\right]$.

Ejercicio 4. Sea $E = K[a]$ una extensión finita de un cuerpo K. Para cada $\alpha \in E$ definimos $L_\alpha : E \to E$ la K-transformación lineal dada por $L_\alpha(x) = \alpha x$.

i) Probar que $m(a, K) = \chi_{L_a} := det(xI - L_a)$.

ii) ¿Para cuáles $\alpha \in E$ vale que $m(\alpha, K) = \chi_{L_\alpha}$.

Ejercicio 5. Sea E/K una extensión. Probar que E/K es algebraica si y sólo si todo anillo A, con $K \subseteq A \subseteq E$, es un cuerpo.

Ejercicio 6. Sea F/K una extensión de cuerpos de grado impar. Probar que si $F = K[u]$ entonces $F = K[u^2]$.

Ejercicio 7. Sea $n \in \mathbb{N}$, $(n : 6) = 1$, y sea $F/\mathbb{Q}$ una subextensión de $\mathbb{C}/\mathbb{Q}$ de grado n. Probar que $\big[F[\sqrt[3]{2}, i\,] : F\big] = 6$.

Ejercicio 8. Sean L/K y M/K dos subextensiones de grado finito de una extensión F/K. Probar que:

i) Si mcd($[L:K]$, $[M:K]$) $= 1$, entonces $[L.M:K] = [L:K]\ .\ [M:K]$.

ii) Si $[L.M:K] = [L:K]\ .\ [M:K]$ entonces $L \cap M = K$. ¿Vale la recíproca?

Ejercicio 9. Sea K un cuerpo de característica $\neq 2$. Sea E/K una extensión de grado 2. Probar que existe $a \in E$ tal que $E = K[a]$ y $a^2 \in K$. Probar que esto no es necesariamente cierto en característica 2.

Ejercicio 10. Factorizar $X^5 + 6X^3 + 15X^2 + 3$ en $\mathbb{Q}(\sqrt{-3}, \sqrt{-2})[X]$.

Ejercicio 11. Sea $a \in \mathbb{Z}[i]$ irreducible y sea K el cuerpo primo de $\mathbb{Z}[i]/\langle a \rangle$. Calcular $[\mathbb{Z}[i]/\langle a \rangle : K\,]$.

Ejercicio 12.

i) Sea $p \in \mathbb{N}$ primo. Calcular $m\,(\xi_p, \mathbb{Q}\,)$ y deducir $[\mathbb{Q}[\xi_p\,] : \mathbb{Q}]$.

ii) Calcular $m\,(\xi_6, \mathbb{Q}\,)$.

iii) Probar que $m\,(\xi_n, \mathbb{Q}\,) = 1 + X + X^2 + \cdots + X^{n-1}$ si y sólo si n es primo.

iv) Probar que $\mathbb{Q}(\xi_5)/\mathbb{Q}$ admite una subextensión cuadrática y caracterizarla.
Sugerencia: $\xi_5 + {\xi_5}^{-1}$.

v) Calcular $m(\xi_7 + {\xi_7}^{-1}, \mathbb{Q})$.

Ejercicio 13. Sea $p \in \mathbb{N}$ primo y sea $a \notin \mathbb{Q}^p$.

i) Probar que $m\,(\sqrt[p]{a}, \mathbb{Q}\,) = X^p - a$.

ii) Sea $K \subseteq \mathbb{C}$ el mínimo cuerpo que contiene a todas las raíces de $m\,(\sqrt[p]{a}, \mathbb{Q}\,)$. Caracterizar K y calcular $[K : \mathbb{Q}\,]$ y $[K : \mathbb{Q}\,[\sqrt[p]{a}\,]]$.

Ejercicio 14. Sea $\{p_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una numeración de los primos positivos.

i) (a) Probar que $\forall\, a \in \mathbb{Q}\left[\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \ldots, \sqrt{p_n}\right]$ con $a \notin \mathbb{Q}$ y $a^2 \in \mathbb{Q}$, existen $b \in \mathbb{Q}$ y enteros $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$ tales que $a = b\sqrt{p_{i_1}} \ldots \sqrt{p_{i_k}}$.
Sugerencia: Probar por inducción un enunciado ligeramente más fuerte.

(b) Calcular $\left[\mathbb{Q}\left[\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \ldots, \sqrt{p_n}\right] : \mathbb{Q}\right]$.

(c) Calcular la cantidad de subextensiones de grado 2 de $\mathbb{Q}\left[\sqrt{p_1}, \sqrt{p_2}, \ldots, \sqrt{p_n}\right]/\mathbb{Q}$.

ii) Hallar $\left[\mathbb{Q}\left[\sqrt{p_i}\right]_{i\in\mathbb{N}} : \mathbb{Q}\right]$.

iii) ¿Existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ tales que $\mathbb{Q}\left[\sqrt{p_i}\right]_{i\in\mathbb{N}} = \mathbb{Q}[\alpha_1, \ldots, \alpha_n]$?

iv) Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado tal que $\mathbb{Q} \subseteq K \subseteq \mathbb{C}$. Deducir $[K : \mathbb{Q}]$.

Ejercicio 15. Sea E/K una extensión algebraica de grado infinito. Probar que existen subextensiones de E/K de grado finito arbitrariamente grande.

Ejercicio 16.

i) Sea $d \in \mathbb{Z}$ libre de cuadrados. Probar que hay sólo dos morfismos de cuerpos $f : \mathbb{Q}\big[\sqrt{d}\,\big] \to \mathbb{C}$ y que en cada caso $f\big(\,\mathbb{Q}\big[\sqrt{d}\,\big]\,\big) \subseteq \mathbb{Q}\big[\sqrt{d}\,\big]$ (de hecho, vale la igualdad).

ii) Sea $d \in \mathbb{Z}$ libre de cubos.

(a) Probar que hay sólo tres morfismos de cuerpos $f : \mathbb{Q}\big[\sqrt[3]{d}\,\big] \to \mathbb{C}$ pero, en general, $f\big(\,\mathbb{Q}\big[\sqrt[3]{d}\,\big]\,\big) \not\subseteq \mathbb{Q}\big[\sqrt[3]{d}\,\big]$.

(b) Considerar $\mathbb{Q}\big[\sqrt[3]{d}, \xi_3\big]$. ¿Qué sucede en este caso?

Ejercicio 17. Sea $K \subseteq \mathbb{C}$ el mínimo cuerpo que contiene a todas las raíces de $x^8 - 2$. Caracterizar K y calcular $[K : \mathbb{Q}\,]$.