

Probabilidad y Estadística
Profesorados y Licenciatura en Computación

Guía N°7: Intervalos de confianza basados en una sola muestra

Ejercicio 1:

La frecuencia de resonancia (en Hz) de las raquetas de tenis de cierto tipo tienen distribución normal con media μ y varianza σ^2 conocida. Se toma una muestra aleatoria de tamaño n .

- a) ¿Cuál es el nivel de confianza del intervalo $\bar{x} \pm 2.81\sigma/\sqrt{n}$?
- b) ¿Cuál es el valor de $z_{\alpha/2}$ que corresponde a un intervalo de confianza para μ del 99.7 %?
- c) Con la muestra dada se obtuvieron los siguientes intervalos de confianza para μ : (114.4 , 115.6) y (114.1 , 115.9).
 - i) ¿Cuál es el valor de la media muestral?
 - ii) ¿Cuál de estos intervalos tiene mayor nivel de confianza?

Ejercicio 2:

Se desea un intervalo de confianza para la media verdadera μ de pérdida de carga para cierto tipo de motor de inducción (en watts), cuando la corriente de línea se mantiene en 10 amps para una velocidad de 1500 rpm. Suponga que la pérdida de carga está normalmente distribuida con $\sigma = 3$.

- a) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para μ cuando $n = 25$ y $\bar{x} = 58.3$.
- b) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para μ cuando $n = 100$ y $\bar{x} = 58.3$. Compare la longitud de este intervalo con la obtenida en (a).
- c) Calcular un intervalo de confianza del 99 % para μ cuando $n = 100$ y $\bar{x} = 58.3$. Compare la longitud de este intervalo con la obtenida en (b).
- d) ¿Qué tan grande debería ser n para que la longitud del intervalo de confianza del 99 % para μ sea a lo sumo 1?

Ejercicio 3:

Un artículo analiza el uso de fotografía infrarroja en color para la identificación de árboles normales en bosques de pino de Oregon. Para una muestra de 69 árboles sanos, la media muestral de densidad de la capa de tinte fue de 1.028 y la desviación estándar muestral de 0.163.

- a) Calcular un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de la densidad de capa de tinte μ para estos pinos.
- b) Suponga que los investigadores habían hecho una estimación de 0.16 para el valor de s antes de reunir los datos, ¿qué tamaño muestral sería necesario para obtener un intervalo de longitud a lo sumo 0.05 y con un nivel de confianza del 95 %?

Ejercicio 4:

Se seleccionó una muestra aleatoria de 539 sujetos pertenecientes a cierta ciudad. Se determinó que 133 de ellos poseían por lo menos un arma de fuego.

- a) Determine un intervalo de confianza del 98 % para la verdadera proporción de propietarios de armas en esa ciudad.
- b) ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para obtener un intervalo de longitud a lo sumo 0.10 y con un nivel de confianza del 98 %, independiente del \hat{p} ?

Ejercicio 5:

Un triatlón es una competencia deportiva que incluye pruebas de natación, ciclismo y carrera. Un artículo reporta una investigación donde participaron triatletas hombres. Se registraron las máximas pulsaciones del corazón (latidos/minutos) durante la actuación en cada uno de los tres eventos. En natación, la media y desviación estándar muestrales fueron 188.0 y 7.2, respectivamente. Se supone que la distribución del ritmo cardíaco es aproximadamente normal.

- a) Si participaron 40 atletas:
 - i) determine un intervalo de confianza del 98 % para la media poblacional de ritmo cardíaco en la prueba

de natación.

ii) determine un intervalo de confianza del 98 % para la varianza poblacional de ritmo cardíaco en la prueba de natación.

b) Si participaron 9 atletas:

i) determine un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional de ritmo cardíaco en la prueba de natación.

ii) determine un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional de ritmo cardíaco en la prueba de natación.

Ejercicio 6:

El intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de una distribución normal con varianza desconocida fue (229.764 , 233.504), para una muestra de tamaño 5. Si ahora usted considera que es mejor un intervalo de confianza del 99 %, ¿cuáles son las cotas de ese intervalo?

Ejercicio 7:

El tiempo de reacción (TR) ante un estímulo es el período que comienza con la presentación de un estímulo y termina con el primer movimiento discernible de cierto tipo. Un artículo reporta que la media muestral del TR para 16 nadadores, al arranque con un disparo, fue de 0.214' y la desviación estándar fue de 0.036'. Suponiendo que el TR tiene aproximadamente distribución normal, obtener:

a) un intervalo de confianza del 90 % para la verdadera media del TR de los nadadores.

b) un intervalo de confianza del 90 % para la desviación estándar del TR de los nadadores.

Ejercicio 8:

Sea X_1, X_2, \dots, X_n una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $[0, \theta]$. Si $Y = \max(X_i)$, se puede demostrar que la función densidad de $U = Y/\theta$ está dada por:

$$f_U(u) = \begin{cases} nu^{n-1} & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

a) Pruebe que:

$$P\left((\alpha/2)^{1/n} \leq \frac{Y}{\theta} \leq (1 - \alpha/2)^{1/n}\right) = 1 - \alpha$$

Utilice este resultado para hallar un intervalo de confianza para θ del $(1 - \alpha)100$ %.

b) Pruebe que: $P\left(\alpha^{1/n} \leq \frac{Y}{\theta} \leq 1\right) = 1 - \alpha$ y utilice este resultado para hallar un intervalo de confianza para θ del $(1 - \alpha)100$ %.

c) ¿Cuál de los dos intervalos es más corto?

d) Si el tiempo de espera de un autobús por la mañana está uniformemente distribuido y los tiempos de espera observados son: 4.2, 3.5, 1.7, 1.2 y 2.4, deduzca un intervalo de confianza del 95 % para θ usando el más corto.