Facultad de Matemática Astronomía y Física
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Guía 6 - Año 2011

Problema 1: Resolver el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 27 cm y uno de sus ángulos es de 30° .

Problema 2: Con los datos indicados en las siguientes figuras, determinar los valores numéricos de las incógnitas que se encuentran en cada una de ellas, esto es: x , y , α .

Problema 3: A 35m del eje del obelisco de la ciudad de Buenos Aires se sitúa un operador con un teodolito. El operador realiza una medición y encuentra que el ángulo subtendido por el obelisco es de $61^{\circ}11'$. Calcule la altura del obelisco teniendo en cuenta que el instrumento está a 1,4 m del suelo.

Problema 4: Dados los vectores $\mathbf{A} = (3,2)$; $\mathbf{B} = (5,-1)$; $\mathbf{C} = (-4,3)$ y $\mathbf{D} = (0,1)$. Hallar, gráfica y analíticamente, las componentes, módulo, dirección y sentido de los vectores:

- $\mathbf{A} + \mathbf{B} - \mathbf{C} - \mathbf{D}$
- $2(\mathbf{A} - 2\mathbf{B} + 3\mathbf{C})$
- $\mathbf{A} - \mathbf{B}$, $\mathbf{B} - \mathbf{A}$, ¿Qué se puede decir sobre esta operación?

Problema 5: Coordenadas Polares.

a) Mediante la representación de las coordenadas cartesianas de un punto en el plano, exprese las relaciones entre las coordenadas rectangulares (cartesianas) y polares. Identifique en el gráfico el polo y el eje polar.

b) Encuentre para dos puntos arbitrarios P_1 y P_2 del plano, la distancia que los separa. Repita este cálculo en coordenadas polares. ¿Cuál método de cálculo resulta más sencillo?

Problema 6: Sea el vector de componentes $(1/3, 2/3)$. Hallar las componentes del vector de módulo 5 que tiene la misma dirección y sentido que el vector dado.

Problema 7: Sean los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ de módulos 3 y 4 respectivamente.

Calcule el módulo de la resultante de ambos vectores cuando el ángulo comprendido entre ellos es $\theta = 30^\circ$. Calcule la dirección de la resultante respecto del vector $\mathbf{A}$.

Problema 8: Dados los vectores $\mathbf{A} = (3,2)$; $\mathbf{B} = (5,-1)$; $\mathbf{C} = (-4,3)$ y $\mathbf{D} = (0,1)$. Hallar:

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, $\mathbf{C} \cdot \mathbf{D}$
- Los ángulos formados entre $\mathbf{A}$ y $\mathbf{C}$ y entre $(3(\mathbf{A} - \mathbf{B}))$ y $(2\mathbf{C} + \mathbf{D})$

Problema 9: Un avión vuela 200 km hacia el NE en una dirección que forma un ángulo de 30° hacia el este de la dirección norte. En ese punto cambia su dirección de vuelo hacia el NO. En esta dirección vuela 60 km formando un ángulo de 45° con la dirección norte.

- Calcular la máxima distancia hacia el este del punto de partida a la que llegó el avión.
- Calcular la máxima distancia hacia el norte del punto de partida, a la que llegó el avión.
- Calcular la distancia a la que se encuentra el avión del punto de partida, al cabo de su recorrido.

Problema 10:

- a) El vector **E** tiene magnitud 17,0 cm y está dirigido 27° en sentido antihorario desde la parte positiva del eje x. Expréselo en notación de vectores unitarios.
- b) El vector **F** tiene una magnitud de 17,0 cm y está dirigido 27° en sentido antihorario desde la parte positiva del eje y. Expréselo en notación de vectores unitarios.
- c) El vector **G** tiene magnitud 17,0 cm y está dirigido 27° en sentido horario desde la parte positiva del eje y.
Expréselo en notación de vectores unitarios.

Problema 11: Los tres vectores desplazamiento de una bocha de croquet se muestran en la figura, con $|\mathbf{A}| = 20$ unidades, $|\mathbf{B}| = 40$ unidades y $|\mathbf{C}| = 30$ unidades. Encuentre:

- a) La resultante en notación de vectores unitarios.
b) La magnitud y dirección de la resultante.

Problemas adicionales

Problema 12: El vector **A** tiene una componente *x* negativa de 3 unidades en longitud y una componente *y* positiva de 2 unidades de longitud.

- a) Determine la expresión de **A** en notación de vectores unitarios.
b) Determine la magnitud y dirección de **A**.
c) ¿Cuál es el vector **B** que sumado a **A** da un vector resultante con componente *x* nula y componente *y* negativa de 4 unidades de longitud?

Problema 13: Dados los vectores $\mathbf{A} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j}$ y $\mathbf{B} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

- a) Dibuje el vector suma $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ y el vector diferencia $\mathbf{D} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$
b) Expresar sus resultados en términos de los vectores bases y en coordenadas polares.

Problema 14: Una estación de radar detecta un barco en emergencia a 17,3 km de distancia sobre una dirección que forma un ángulo de 136° con la dirección norte en el sentido horario. Relativo a la misma estación se encuentra un avión de rescate a una distancia horizontal de 19,6 km, sobre una dirección que forma un ángulo de 153° con la dirección norte en sentido horario y con una elevación de 2,2 km.

- a) Escriba el vector posición para el barco relativo al aeroplano, representando la dirección este por el versor **i**
b) ¿Cuánto vale la distancia entre el aeroplano y el barco?

Problema 15: Dos observadores en tierra, separados por una distancia de 1000m, observan un globo aerostático que se encuentra elevado entre ellos. Ambos observadores y el globo se hallan en un mismo plano vertical. Uno de los observadores mide un ángulo de elevación de 65° y el otro mide 35°. Calcule la altura a la que se encuentra el globo.

Problema 16: Una persona camina a 25° de la dirección norte hacia el este, recorriendo 3,1 km. ¿Qué distancia debería recorrer hacia el norte y el este para llegar a la misma posición?